

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

GLAMIDOLO 0,25% collirio, polvere e solvente per soluzione
GLAMIDOLO 0,50% collirio, polvere e solvente per soluzione

Dapiprazolo cloridrato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è GLAMIDOLO collirio e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Glamidolo collirio
3. Come usare GLAMIDOLO collirio
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare GLAMIDOLO collirio
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è GLAMIDOLO collirio e a cosa serve

Glamidolo collirio contiene il principio attivo dapiprazolo, una molecola in grado di determinare un abbassamento della pressione intraoculare ed il restringimento della pupilla (miosi) ed è indicato nelle diverse forme di una malattia degli occhi nota come glaucoma (glaucoma da chiusura d'angolo prodromico o intermittente, acuto, subacuto e cronico; glaucoma misto, glaucoma pigmentario; profilassi della chiusura d'angolo negli occhi a rischio).

Il farmaco è adatto anche per l'allargamento della pupilla (richiamo della midriasi farmacologica) e per il restringimento della pupilla (miosi) preparatorio alla chirurgia dell'iride (all'iridectomia).

2. Cosa deve sapere prima di prendere GLAMIDOLO collirio

Non prenda GLAMIDOLO collirio se è allergico al dapiprazolo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6). Il prodotto non deve essere utilizzato nelle condizioni nelle quali l'effetto miotico non è appropriato, come nei casi di irite acuta.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere GLAMIDOLO collirio.

L'uso, specie se prolungato, del prodotto può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso: interrompa il trattamento. Usi il farmaco con cautela in caso in cui i suoi reni non funzionano bene (insufficienza renale).

Non usi una dose superiore a quella prescritta, aumentando la frequenza delle somministrazioni.

Bambini ed adolescenti

Non ci sono dati disponibili

Altri medicinali e GLAMIDOLO collirio

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

GLAMIDOLO collirio non presenta incompatibilità specifiche con altri farmaci o sostanze di comune impiego. Il prodotto non va miscelato con altri farmaci liquidi.

Gravidanza allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico prima di prendere questo medicinale.

Sebbene non siano state trovate controindicazioni all'uso del farmaco durante la gravidanza e l'allattamento, se ne consiglia l'impiego solo nei casi di assoluta necessità e sotto il controllo del medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Dopo l'uso del medicinale, usi cautela nella guida, o nelle attività condotte con scarsa illuminazione poiché GLAMIDOLO collirio, determinando modificazioni del diametro pupillare, può ridurre la capacità di adattamento visivo alle variazioni di luminosità ambientale.

GLAMIDOLO collirio contiene benzalconio cloruro.

Può causare irritazione all'occhio. Eviti il contatto con lenti a contatto morbide. Tolga le lenti a contatto prima dell'applicazione, e aspetti almeno 15 minuti prima di riapplicarle. E' nota l'azione decolorante nei confronti delle lenti a contatto morbide

3. Come usare GLAMIDOLO collirio


Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio, o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Le dosi raccomandate sono riportate di seguito:

- Per richiamo della midriasi: 1-2 gocce ogni 5 minuti per 3 volte nell'occhio da trattare.
- Per attacco acuto di glaucoma: 1-2 gocce ogni minuto per 5 minuti; quindi 1-2 gocce ogni 15 minuti fino a risoluzione dell'attacco nell'occhio a rischio.
- Per tutte le altre indicazioni: 1-2 gocce ogni 8 ore.

Istruzioni per l'uso

1. Apra il flacone di vetro contenente la polvere. Premendo il flacone di plastica, versi il solvente in esso contenuto all'interno del flacone di vetro.
2. Richiuda il flacone di vetro utilizzando il tappo di gomma ed agiti.
3. Tolga il tappo di gomma e inserisca sul flacone di vetro il contagocce contenuto nella bustina a parte.
4. Tolga il tappino di plastica dal contagocce, e instilli il collirio.



Se prende più GLAMIDOLO collirio di quanto deve

Consulti il medico o il farmacista.

Se dimentica di prendere GLAMIDOLO collirio

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Il GLAMIDOLO collirio può determinare, in pazienti ipersensibili, arrossamento locale e senso di bruciore.

Effetti indesiderati non noti (la frequenza non può essere stabilita sulla base dei dati disponibili)

- Iperemia oculare, irritazione oculare, ptosi palpebrale, eritema della palpebra, edema delle palpebre, edema congiuntivale, prurito oculare, cheratite puntata, edema corneale, fotofobia, occhio secco, lacrimazione aumentata, visione offuscata
- Cefalea
- Dolore della faccia

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo

www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare GLAMIDOLO collirio

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Tenga questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola .

GLAMIDOLO collirio è disponibile sotto forma di polvere, da sciogliere al momento dell'uso con l'apposito solvente (vedi "Come usare GLAMIDOLO collirio").

Una volta preparata, la soluzione va utilizzata entro 3 settimane.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene GLAMIDOLO collirio

Il principio attivo è dapiprazolo cloridrato.

GLAMIDOLO 0,25% collirio contiene Dapiprazolo cloridrato 12,5 mg

GLAMIDOLO 0,5% collirio contiene Dapiprazolo cloridrato 25 mg

Gli altri componenti sono:

- nella polvere: mannitolo e sodio cloruro;
- nel solvente: idrossipropilmetilcellulosa, **benzalconio cloruro**, sodio edetato, sodio fosfato bibasico, sodio fosfato monobasico, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Descrizione dell'aspetto di GLAMIDOLO collirio e contenuto della confezione

GLAMIDOLO 0,25% collirio contiene un flacone di polvere cristallina da bianca a quasi bianca, inodore da 5 ml e un flacone di solvente incolore da trasparente a leggermente opalescente, poco viscoso da 5 ml.

GLAMIDOLO 0,50% collirio contiene un flacone di polvere cristallina da bianca a quasi bianca, inodore da 5 ml e un flacone di solvente incolore da trasparente a leggermente opalescente, poco viscoso da 5 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

OmniVision Italia S.r.l.

Via Montefeltro, 6

20156 Milano

Produttori

TUBILUX PHARMA S.p.A. -Via Costarica, 20/22

00071 Pomezia (Roma)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato a